

01. Sobre o que diz a Constituição Federal de 1988, na Seção II, que trata especificamente da saúde, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É vedada aos gestores locais do SUS a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público ou por contratação direta.
- b) A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, a participação da comunidade e o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, constituem as diretrizes do SUS.
- c) A iniciativa privada poderá participar do SUS, de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- d) A saúde como direito de todos e dever do Estado é garantida por meio do acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

02. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta **INCORRETA**.

Conforme consta no Art. 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS, além de outras atribuições:

- a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- d) participar da formulação da política e da execução do controle social e epidemiológico.

03. Em relação aos principais princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a opção **INCORRETA**.

- a) integralidade de assistência nos processos curativos
- b) igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- c) universalidade de acesso em todos os níveis de assistência
- d) participação da comunidade por meio das entidades representativas

04. A Lei nº. 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. Em função do que rege essa lei, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, e o Estado tem a responsabilidade de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas das três instâncias de governo, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- c) Faz parte do campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador e de assistência previdenciária e terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- d) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, de forma direta ou pela participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis crescentes de complexidade.

05. De acordo com a Lei nº 8142, sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada pelo Congresso Nacional, publicada no **Diário Oficial da União**, em 31 de dezembro de 1990, e que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, marque a resposta **CORRETA**.

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á, por determinação do poder executivo, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- c) O Conselho de Saúde, de caráter temporário e deliberativo, constitui órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.

06. Estes materiais apresentam fluxo quando uma força é aplicada. Com o aumento da força de cisalhamento, a velocidade de cisalhamento aumenta, sendo estes materiais conhecidos como sistemas de “cisalhamento fino”, pois ocorre à medida que as moléculas poliméricas se alinham ao longo do eixo e deslizam ao passar umas pelas outras, tornando o sistema mais fluido. Esse tipo de reologia aplica-se a líquidos:

- a) plásticos.
- b) pseudoplásticos.
- c) dilatantes.
- d) tixotrópicos.

07. Marque a alternativa **CORRETA**.

Em um sistema líquido heterogêneo, podemos considerar que as tensões interfaciais entre a película formada pelos emulgentes e o óleo é menor, enquanto que a interface entre a película e a água é maior, conferindo-lhe grande estabilidade. Essas informações aplicam-se à teoria da:

- a) película adsorvida, pois formará emulsão A/O.
- b) da tensão superficial, pois formará emulsão A/O.
- c) da cunha orientada, pois formará emulsão O/A.
- d) película adsorvida, pois formará emulsão O/A.

08. Marque a alternativa **CORRETA**.

Existe um fator que se opõe à energia mecânica para a formação e estabilidade de um sistema emulsionado, esse fator se refere:

- a) à viscosidade.
- b) aos tensoativos.
- c) à densidade.
- d) à tensão superficial.

09. De acordo com a equação de Stokes, são fatores inerentes às propriedades reológicas de uma suspensão, **EXCETO**:

- a) viscosidade.
- b) tamanho da partícula.
- c) densidade.
- d) carga da partícula.

10. Em colírios, os conservantes devem ter as seguintes propriedades, **EXCETO**:

- a) largo espectro de ação.
- b) baixa solubilidade.
- c) ação contínua.
- d) isenção de toxicidade.

11. A colestiramina é um fármaco que pode ser utilizado no tratamento hipercolesterolemia. Por que o uso concomitante com medicamentos como: glicosídeos digitálicos, tiazídicos, varfarina, tetraciclina, tiroxina, pravastatina, fluvastatina, ácido fólico, fenilbutazona, aspirina e ácido ascórbico **NÃO** é recomendado?

- a) A colestiramina causa indução enzimática, aumentando a concentração plasmática dos medicamentos citados.
- b) A colestiramina aumenta a excreção dos medicamentos citados.
- c) A colestiramina se complexa com os medicamentos citados, impedindo a absorção.
- d) A colestiramina causa inibição enzimática, diminuindo a concentração plasmática dos medicamentos citados.

12. Marque a opção em que há somente representantes dos antibióticos beta-lactâmicos.

- a) cefalexina; amoxicilina; eritromicina; benzilpenicilina e cefalotina
- b) claritromicina; azitromicina; ticarcilina; piperacilina e neomicina
- c) gentamicina; ciprofloxacina; rifampicina; clindamicina e tobramicina
- d) flucloxacilina; amoxicilina; cefapirina; imipenem e cefalexina

13. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

Os diuréticos tiazídicos e fármacos relacionados, tais como hidroclorotiazida e clortalidona, são usados no tratamento de hipertensão leve e insuficiência cardíaca congestiva. Qual das opções abaixo descreve o mecanismo de ação desses fármacos?

- a) Bloqueador do transportador Na^+/Cl^- presente no túbulo contorcido distal.
- b) Bloqueador do transportador $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ presente no túbulo contorcido proximal.
- c) Antagonista dos receptores de aldosterona, funcionando como poupador de potássio.
- d) Inibidores da anidrase carbônica.

14. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

A cimetidina, fármaco usado no tratamento de úlceras, potencializa a ação do propranolol. Que mecanismo explica a interação medicamentosa desses fármacos?

- a) A cimetidina compete com as proteínas plasmáticas, diminuindo o estado livre do propranolol.
- b) A cimetidina inibe o metabolismo de primeira passagem do propranolol, aumenta a concentração plasmática e potencializa a ação do propranolol.
- c) A cimetidina diminui a excreção do propranolol.
- d) A cimetidina induz o metabolismo de primeira passagem do propranolol, aumenta a concentração plasmática e potencializa a ação do propranolol.

15. Marque a alternativa **CORRETA**.

O uso de inibidores da enzima conversora (ECA) pode ocasionar eosinofilia, neutropenia e agranulocitose. Para monitorar esses efeitos adversos, pode-se realizar o seguinte exame laboratorial:

- a) dosagem de creatinina.
- b) dosagem de proteínas totais.
- c) dosagem de fosfatase alcalina.
- d) hemograma completo.

16. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

Qual das opções abaixo apresenta somente hipoglicemiantes da classe das tiazolidinadionas?

- a) tolbutamida e clorpropamida
- b) glipizida e glicazida
- c) rosiglitazona e pioglitazona
- d) glimepirida e glibenclamida

17. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

A inibição da lipase pancreática, impedindo a degradação da gordura dietética em ácidos graxos e gliceróis é um mecanismo importante para o tratamento da obesidade. Qual alternativa abaixo cita o fármaco que apresenta esse mecanismo?

- a) sibutramina
- b) orlistat
- c) rimonabanto
- d) femproporex

18. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

Os bisfosfonatos, tais como o alendronato dissódico, são usados no tratamento da osteoporose. Qual alternativa abaixo contém o mecanismo de ação desses fármacos?

- a) Reduzem a renovação óssea por inibir o recrutamento e promover a apoptose dos osteoclastos.
- b) Induzem a produção dos osteoblastos pela redução da excreção da vitamina D.
- c) Estimulam diretamente a atividade dos osteoblastos, transformando a vitamina D3 em calcitriol.
- d) Inibem os fatores de crescimento e estimulam o recrutamento dos osteoclastos.

19. Marque a alternativa **CORRETA**.

A varfarina é um agente anticoagulante que inibe a vitamina K Redutase, bloqueando a γ -carboxilação de resíduos de glutamato da protrombina, os fatores VII, IX e X e a proteína C. Um dos efeitos adversos desse fármaco é:

- a) o aumento da glicose no sangue.
- b) o aumento do tempo de protrombina.
- c) o aumento dos eosinófilos no sangue.
- d) a diminuição da fosfatase alcalina.

20. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

Boca seca, visão embaçada, constipação e retenção urinária são efeitos adversos produzidos por antidepressivos tricíclicos. Qual alternativa abaixo explica o mecanismo desses efeitos?

- a) Bloqueio dos receptores colinérgicos muscarínicos.
- b) Bloqueio do recaptador de noradrenalina no terminal.
- c) Ativação dos receptores alfa-1 pré-sinápticos.
- d) Inibição da enzima monoamino-oxidase.

21. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à terapia nutricional.

- 1 - A prescrição de uma nutrição parenteral baseia-se na necessidade calórico-proteica de cada paciente e em metas do suporte nutricional, não devendo sofrer alterações em sua composição na medida da variação das condições mórbidas do paciente.
- 2 - A nutrição parenteral periférica é administrada na mão ou no antebraço, sendo uma via de escolha para longos períodos de terapia e sem desnutrição grave.
- 3 - A nutrição enteral pode ser administrada por via gastrointestinal ou enteral, já a nutrição parenteral é administrada apenas por via intravenosa.
- 4 - A nutrição parenteral na via periférica apresenta menor risco de complicações, enquanto a via central apresenta maiores riscos de complicações e infecções.
- 5 - A nutrição enteral preserva a sequência fisiológica de digestão e absorção dos nutrientes antes que esses sejam liberados para a circulação periférica.

A partir dessa análise, pode-se concluir que:

- a) apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
- b) apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.
- c) apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas.
- d) apenas as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas.

22. Marque a alternativa **CORRETA**.

Algumas medidas podem ser adotadas, dentro de um hospital, para assegurar o uso racional dos medicamentos, uma delas se refere à manipulação de medicamentos na farmácia hospitalar. Sobre o procedimento de dose unitária, segundo a Resolução nº 67/2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em farmácia, podemos definir o procedimento de dose unitária como:

- a) a dose unitária é a adequação da forma farmacêutica à quantidade correspondente de dose prescrita para um determinado paciente, preservadas suas características de qualidade e rastreamento.
- b) a dose unitária é a adequação da forma farmacêutica em doses previamente selecionadas para atendimento a prescrições nos serviços de saúde.
- c) uma das vantagens do sistema de distribuição por dose unitária é a diminuição de estoques nas unidades assistenciais, com redução de perdas e maior controle dos estoques e prazo de validade.
- d) o envio ordenado de medicamentos para as clínicas, com vista ao atendimento do conjunto de pacientes por um período de 24 horas.

23. O objetivo dos Centros de Informação de Medicamentos (CIM) é prover informações claras, precisas e aplicáveis sobre medicamentos, de modo a promover o seu uso racional. Quanto às atribuições do CIM, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Desenvolver atividades de pesquisa sobre o uso de medicamentos.
- b) Realizar revisões do uso de medicamentos.
- c) Publicar materiais educativos/informativo sobre os medicamentos.
- d) Tornar acessível a consulta às fontes primárias, secundárias e terciárias de informação para esclarecimento de questões, pela equipe de saúde.

24. Relatos antigos, de 325 d.C., citam que as questões sobre as infecções hospitalares eram tratadas confinando os doentes em ambientes restritivos, propiciando a transmissão das moléstias. Hoje existe a preocupação com o controle das infecções hospitalares, que podem ser definidas como aquelas adquiridas após a admissão do paciente, e que se manifestam durante a internação ou após a alta, quando puderem ser relacionadas com a internação ou com procedimentos hospitalares. Sobre as infecções hospitalares, é **CORRETO** afirmar que:

- a) convencionou-se infecção hospitalar a toda manifestação clínica que se apresenta a partir de 72 horas após a admissão, para qualquer situação de internação do paciente.
- b) a transmissão transplacentária, em recém-nascidos, é um caso grave de infecção hospitalar.
- c) os pacientes que já se internam com infecção hospitalar são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital que os recebe.
- d) geralmente as infecções hospitalares são associadas aos diversos procedimentos invasivos como: os cirúrgicos, os cateterismos, a ventilação mecânica entre outros.

25. Marque a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

Padronização e seleção de medicamentos são atividades que proporcionam o uso racional de medicamentos no âmbito hospitalar. Qual Comissão é responsável por implementar uma política de uso racional de medicamentos nos hospitais?

- a) A Comissão de Farmácia e Terapêutica.
- b) A Comissão de Infecção Hospitalar.
- c) A Comissão de Padronização de Medicamentos.
- d) A Comissão de Ética em Pesquisa.

26. A curva ABC tem sido utilizada pela administração de hospitais em programas de suprimento e produção, aplicação de capital de giro e disponibilização de recursos, em situações de urgência. A administração de materiais do hospital define as classes ABC obedecendo a faixas predeterminadas em que se tem, no máximo, 20% de itens classe A, representando 50% do custo, 20% a 30% de itens da classe B, representando 20% a 30% do custo e 50% de itens da classe C, representando 20% do custo, podendo haver uma pequena variação no cenário hospitalar brasileiro. Marque a alternativa que contém os itens que devem ser cortados em uma estratégia de redução de gastos.

- a) itens da classe A
- b) itens da classe B
- c) itens da classe C
- d) itens das classes B e C

27. Na gestão de materiais, o controle de estoques determina “quando” e “quanto” comprar para uma aquisição adequada. Para realizar sua atividade de forma eficiente, o controle de estoque se utiliza de vários parâmetros como: o consumo médio mensal, o estoque de segurança, a curva ABC, o estoque máximo, o ponto de ressuprimento, o lote econômico de compras e outros. Sobre o estoque de segurança, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) O estoque de segurança depende do consumo, do tempo de abastecimento, mas independe da classificação ABC do produto.
- b) O estoque de segurança é um estoque extra, não quantificado no estoque normal, que assegura a terapêutica do paciente.
- c) O estoque de segurança é a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva, para garantir a continuidade do procedimento em caso de ocorrências imprevisíveis.
- d) O estoque de segurança evita a ruptura do estoque que apresenta como consequência o próprio custo da ruptura, mas não interfere no nível de atendimento prestado ao paciente.

28. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que constitui reação adversa a medicamentos (RAM) do tipo A.

- a) síndrome da retirada dos opiáceos
- b) reação de hipersensibilidade aos beta-lactâmicos
- c) sonolência devida aos anti-histamínicos
- d) teratogênese causada pela talidomida

29. Marque a alternativa **CORRETA**.

Fase dos estudos de novos medicamentos cuja finalidade é obter informação do produto na prática habitual de uso, geralmente participam deles milhares de pacientes, em estudos multicêntricos:

- a) estudos pré-clínicos.
- b) estudos clínicos de fase II.
- c) estudos clínicos de fase III.
- d) estudos de pós-comercialização.

30. As alternativas abaixo são fases do Método Dáder, **EXCETO**:

- a) fase de estudo.
- b) fase de intervenção.
- c) entrevistas sucessivas.
- d) fase de aconselhamento.

31. Das alternativas abaixo, assinale a que **NÃO** constitui fator que aumenta o risco para a osteoporose.

- a) Ausência de histórico prévio de fratura.
- b) Antecedentes familiares.
- c) Perda de visão como consequência da idade.
- d) Baixa exposição solar.

32. Marque a alternativa **CORRETA**.

Segundo o Terceiro Consenso de Granada, **NÃO** é considerado um tipo de PRM:

- a) conservação inadequada.
- b) duplicidade.
- c) interações medicamentosas.
- d) problema de saúde não tratado.

33. Supondo-se que um farmacêutico disponha das fontes de informação científicas citadas abaixo, assinale aquela que apresenta o maior nível de evidência.

- a) relato de caso.
- b) série de casos.
- c) estudo de coorte.
- d) investigação em animais.

34. Assinale a alternativa que contém a condição na qual é prescindível, segundo a Lei nº 8.666/93, a compra de medicamentos para o setor público através de licitação.

- a) Aquisições de itens de pequeno valor (de 8 a 80 mil reais).
- b) Operações entre entidades públicas e sociedades civis sem fins lucrativos.
- c) Quando a aquisição pode ser feita via pregão eletrônico.
- d) Emergência.

35. Marque a alternativa **CORRETA**.

É um fator de risco cardiovascular (FRCV) não modificável:

- a) inatividade física.
- b) obesidade.
- c) idade.
- d) diabetes.

36. Marque a alternativa **CORRETA**.

Pretende-se preparar 500 mL de uma solução de ácido bórico a 1,5%. O equivalente em NaCl é igual a 0,52. Neste caso, podemos afirmar que a quantidade de cloreto de sódio necessária para isotonzar esta preparação corresponde a:

- a) 0,68 g
- b) 0,75 g
- c) 0,60 g
- d) 0,78 g

37. Marque a alternativa CORRETA.

Um farmacêutico deseja preparar uma emulsão tipo O/A utilizando emulgentes primários e secundários. Para tanto, ele tem vários grupos para selecionar. O grupo correto a ser selecionado deve ser:

- a) span 80 e tween 20
- b) metilcelulose e goma arábica
- c) natrosol e span 80
- d) tween 80 e goma adraganta

38. Marque a alternativa CORRETA.

As preparações farmacêuticas oficinais que contêm, em cada mililitro, os princípios ativos solúveis de 1g da droga vegetal respectiva, denominam-se:

- a) elixires.
- b) tinturas.
- c) extratos fluidos.
- d) infusos.

39. Pretende-se fabricar comprimidos de AAS, entretanto sabe-se que existe incompatibilidade com um dos excipientes abaixo. Selecione a opção CORRETA.

- a) gelatina.
- b) estearato de magnésio.
- c) amido.
- d) manitol.

40. Marque a alternativa CORRETA.

Em relação ao peso médio das cápsulas contendo até 300 mg de pó, a F. Bras. (5ª ed. 2010) recomenda que sejam pesadas, individualmente, n (número) cápsulas cujo desvio padrão da média (dpm) seja de:

- a) $n = 20$; dpm $\pm 10\%$
- b) $n = 10$; dpm $\pm 5\%$
- c) $n = 30$; dpm $\pm 7,5\%$
- d) $n = 40$; dpm $\pm 10\%$

41. As ações de farmacovigilância estão voltadas para a detecção precoce de reações adversas desconhecidas ou interações medicamentosas e para a detecção de aumentos na frequência de ocorrência de reações adversas conhecidas. O principal instrumento de um sistema de farmacovigilância é o boletim de notificação espontânea e sua principal limitação é:

- a) a falta de informação sobre a descrição da reação suspeita observada.
- b) a escassez de dados sobre o comportamento da reação adversa após a retirada ou reintrodução do medicamento em questão.
- c) o sub-registro, decorrente da forma de coleta de informações.
- d) a ausência de informação sobre a situação clínica dos pacientes, tais como patologias pré-existentes e dados laboratoriais.

42. Que sistema de distribuição se enquadra às vantagens descritas abaixo?

- 1 - Redução da incidência de erros de administração de medicamentos.
- 2 - Participação efetiva do farmacêutico na definição da terapêutica medicamentosa.
- 3 - Maior segurança para o médico em relação ao cumprimento de suas prescrições.
- 4 - Redução do tempo da enfermagem com atividades relacionadas ao medicamento, permitindo maior disponibilidade para o cuidado do paciente.

Assinale a opção que responde **CORRETAMENTE** à pergunta.

- a) sistema de distribuição por dose unitária.
- b) sistema de distribuição individualizado.
- c) sistema de distribuição combinado ou misto.
- d) sistema de distribuição coletivo.

43. Ao fim da década de 50, medicamentos mais potentes foram lançados no mercado, causando também efeitos colaterais importantes. Desde então, houve a necessidade de revisão dos sistemas tradicionais de distribuição de medicamentos devido à em vista da incidência de erros de administração de medicamentos dentro dos hospitais, visando à melhora da segurança na distribuição e administração dos mesmos. O sistema de distribuição (SDM) por dose unitária se mostrou mais vantajoso para o paciente. Sobre o Sistema de Distribuição por Dose Unitária, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) É o sistema de distribuição que oferece condições razoáveis para um adequado seguimento da terapia medicamentosa do paciente, mas que se encontra aquém de outros tipos de distribuição utilizados internacionalmente.
- b) É a distribuição ordenada dos medicamentos com formas e dosagens prontas para serem administradas a um determinado paciente de acordo com a prescrição médica, num certo período de tempo.
- c) Para sua implantação, não é necessário um laboratório de farmacotécnica dentro da farmácia, carrinhos ou cestas para entrega de doses, nem outro tipo de equipamento como máquina de selagem e etiquetagem.
- d) O SDM por dose unitária proporciona uma diminuição de estoques nas unidades assistenciais, sem acarretar em redução de perdas de medicamentos para o hospital.

44. Marque a alternativa **CORRETA**.

Durante o seguimento farmacoterapêutico, constituem a principal fonte de informação:

- a) os exames laboratoriais.
- b) as entrevistas com o paciente.
- c) as bases de dados confiáveis.
- d) a opinião de especialistas.

45. Marque a alternativa **CORRETA**.

É o ato profissional no qual o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um medicamento que não necessita de receita médica, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde a pedido do paciente ou seu encaminhamento ao médico, quando o referido problema necessitar de atuação:

- a) consulta farmacêutica.
- b) indicação farmacêutica.
- c) seguimento farmacoterapêutico.
- d) dispensação.

46. Em um determinado serviço de saúde, o medicamento furosemida solução injetável 20mg/2ml faltou por 20 dos 25 dias de funcionamento da unidade durante o mês. Sabendo-se que o consumo médio mensal é de 1.500 unidades/mês, a demanda **NÃO** atendida foi de:

- a) 1.000 unidades/mês.
- b) 900 unidades/mês.
- c) 1.200 unidades/mês.
- d) 1.100 unidades/mês.

47. Marque a alternativa **CORRETA**.

A denominação “temperatura ambiente”, segundo a classificação farmacopéica para a conservação de medicamentos, refere-se ao intervalo de:

- a) 15 a 25 °C
- b) 15 a 30 °C
- c) 10 a 25 °C
- d) 20 a 30 °C

48. Marque a alternativa **CORRETA**.

Segundo a Lei nº 5.991/73, o termo que se refere ao setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo, de pequena unidade hospitalar ou equivalente é:

- a) posto de medicamentos.
- b) distribuidora.
- c) dispensário de medicamentos.
- d) unidade volante.

49. Qual das condições abaixo **NÃO** é um pré-requisito do processo de licitação.

- a) preferência ao fornecedor local.
- b) procedimento formal.
- c) igualdade de condições entre os licitantes.
- d) publicidade do ato.

50. Um farmacêutico necessita realizar a programação de medicamentos de um município sem ter nenhuma disponibilidade de dados históricos de consumo, demográficos e epidemiológicos. Nesse caso, o método _____ pode ser utilizado. Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

- a) consumo histórico
- b) consumo ajustado
- c) curva ABC
- d) perfil epidemiológico