

01. Sobre o que diz a Constituição Federal de 1988, na Seção II, que trata especificamente da saúde, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É vedada aos gestores locais do SUS a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público ou por contratação direta.
- b) A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, a participação da comunidade e o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, constituem as diretrizes do SUS.
- c) A iniciativa privada poderá participar do SUS, de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- d) A saúde como direito de todos e dever do Estado é garantida por meio do acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

02. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta **INCORRETA**.

Conforme consta no Art. 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS, além de outras atribuições:

- a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- d) participar da formulação da política e da execução do controle social e epidemiológico.

03. Em relação aos principais princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a opção **INCORRETA**.

- a) integralidade de assistência nos processos curativos
- b) igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- c) universalidade de acesso em todos os níveis de assistência
- d) participação da comunidade por meio das entidades representativas

04. A Lei nº. 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. Em função do que rege essa lei, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, e o Estado tem a responsabilidade de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas das três instâncias de governo, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- c) Faz parte do campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador e de assistência previdenciária e terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- d) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, de forma direta ou pela participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis crescentes de complexidade.

**05.** De acordo com a Lei nº 8142, sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada pelo Congresso Nacional, publicada no **Diário Oficial da União**, em 31 de dezembro de 1990, e que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, marque a resposta **CORRETA**.

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á, por determinação do poder executivo, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- c) O Conselho de Saúde, de caráter temporário e deliberativo, constitui órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.

**06.** Marque a alternativa **CORRETA**.

A estrutura anatômica que se origina do ângulo ântero-medial do assoalho da órbita, imediatamente lateral à abertura do canal nasolacrimal, é:

- a) o músculo palpebral inferior.
- b) a periórbita.
- c) o canal infraorbital.
- d) o músculo oblíquo inferior.

**07.** Marque a alternativa **CORRETA**.

A camada do couro cabeludo que pode permitir a propagação de infecção através das veias emissárias para as estruturas intracranianas é denominada:

- a) tela subcutânea densa.
- b) tecido subaponeurótico frouxo.
- c) pericrânio.
- d) aponeurose.

**08.** Marque a alternativa **CORRETA**.

O sangramento decorrente da retirada da tonsila palatina pode ser controlado, na impossibilidade de manobra local, através da ligadura da artéria:

- a) facial.
- b) tireóidea.
- c) faríngea.
- d) lingual.

**09.** Marque a alternativa **CORRETA**.

A ausência de suporte para o músculo tensor do véu palatino, resultando em disфонia ou disfagia, pode ser decorrente a uma fratura:

- a) do ângulo mandibular.
- b) do processo coronoide.
- c) do hêmulo pterigóideo.
- d) do palato duro.

**10. Marque a alternativa CORRETA.**

Apresenta a forma de uma lâmina quadrilátera, alcançando a língua por baixo e pelo lado, recobrimdo boa parte da artéria lingual e do nervo glossofaríngeo. Atua na depressão e na retrusão da língua:

- a) músculo genioglosso
- b) músculo estiloglosso
- c) músculo hioglosso
- d) músculo palatoglosso

**11. Marque a alternativa CORRETA.**

O sangramento pulsátil de uma artéria no fundo do alvéolo mandibular recebe o fluxo sanguíneo em sua origem decorrente da artéria:

- a) facial.
- b) massetérica.
- c) mandibular.
- d) maxilar.

**12. Marque a alternativa CORRETA.**

A estrutura anatômica que penetra no forame retromentoniano inferior, podendo oferecer uma inervação suplementar dos incisivos, denomina-se:

- a) nervo milohióideo.
- b) nervo lingual.
- c) nervo alveolar inferior.
- d) nervo digástrico.

**13. Marque a alternativa CORRETA.**

Percorre o assoalho da boca e possui um componente aferente e um componente eferente, este possuindo fibras destinadas às glândulas submandibular e sublingual:

- a) nervo hipoglosso.
- b) nervo corda do tímpano.
- c) nervo lingual.
- d) nervo glossofaríngeo.

**14. Marque a alternativa CORRETA.**

Quando planejamos a sedação intravenosa ou por inalação, a semiologia pré-operatória deve sempre incluir a revisão dos seguintes sistemas:

- a) cardiovascular, respiratório e renal.
- b) cardiovascular, respiratório e nervoso.
- c) cardiovascular, renal e nervoso.
- d) cardiovascular, renal e hepático.

**15. Marque a alternativa CORRETA.**

O exame físico do paciente em cirurgia maxilofacial deve ser iniciado por:

- a) palpação dos linfonodos regionais.
- b) aferição dos sinais vitais.
- c) palpação dos ossos da face.
- d) inspeção da orofaringe e mucosa bucal.

**16. Marque a alternativa CORRETA.**

Na aferição da pressão arterial, a borda inferior do manguito deve localizar-se:

- a) de dois a quatro centímetros acima da fossa anticubital.
- b) tocando a fossa infracubital.
- c) a aproximadamente dois centímetros abaixo da fossa cubital.
- d) tocando a fossa cubital.

**17. Marque a alternativa CORRETA.**

A flora microbiológica normalmente encontrada na pele facial inclui:

- a) *Streptococcus sp* e *Proteus sp*.
- b) *Actinomyces sp* e *Bacteroides fragilis*.
- c) *Bacteroides fragilis* e *Klebsiella sp*.
- d) *Corynebacterium diphtheriae* e *Propionibacterium acnes*.

**18. Marque a alternativa CORRETA.**

Nas infecções odontogênicas, os antibióticos efetivos administrados por via oral são:

- a) rifampicina e clindamicina.
- b) metronidazol e moxifloxacina.
- c) amoxicilina e fradamicina.
- d) amoxicilina com ácido clavulânico e penicilina G benzatina.

**19. Marque a alternativa CORRETA.**

Os antibióticos de amplo espectro úteis para infecções odontogênicas complexas incluem:

- a) azitromicina e clindamicina.
- b) penicilina e tetraciclina.
- c) azitromicina e amoxicilina.
- d) clindamicina e amoxicilina com ácido clavulânico.

**20. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a VERDADEIRA:**

- a) O espectro antibacteriano da clindamicina inclui quase todas as bactérias anaeróbicas.
- b) As tetraciclina são geralmente consideradas antibióticos de pequeno espectro.
- c) As cefalosporinas de terceira geração são mais eficazes do que as de segunda geração contra cocos Gram-positivos.
- d) As fluoroquinolonas são eficazes contra a maioria das bactérias anaeróbicas.

**21. Assinale o item que expressa uma afirmação CORRETA.**

- a) Na acromegalia, o excesso de STH causa estímulo proliferativo sobre os condrócitos da cartilagem de conjugação.
- b) Na acromegalia, o excesso de STH ocorre após a ossificação da cartilagem epifisária.
- c) No raquitismo, há hipovitaminose D que ocorre após a ossificação dos centros epifisários.
- d) No hipopituitarismo, há aceleração da calcificação e ausência das cartilagens de conjugação.

**22. Marque a alternativa CORRETA.**

Na etiopatogenia das osteomielites, os agentes mais comuns são:

- a) estreptococos, pneumococos e *Klebsiella*
- b) *E. coli*, *pseudomonas* e estreptococos
- c) estafilococos coagulase-positivos
- d) estreptococos e estafilococos

**23. Marque a alternativa CORRETA.**

Qual dos itens abaixo melhor define a doença de Caffey?

- a) osteodistrofia fibrosa
- b) osteomielite esclerosante
- c) encondromatose
- d) hiperostose cortical

**24. Marque a alternativa CORRETA.**

Como exemplos de disostoses comprometendo crânio e face, destacamos:

- a) síndrome de Apert e síndrome de Crouzon
- b) osteocondromatose e displasia fibrosa
- c) picnodisostose e osteopetrose
- d) osteogênese imperfeita e doença de Ollier

**25. Marque a alternativa CORRETA.**

Uma alteração genômica, a perda do gene Rb em células germinativas, o retinoblastoma hereditário, está associada a risco aumentado de:

- a) sarcoma de Ewing
- b) osteossarcoma
- c) linfomas
- d) plasmocitoma

**26. Marque a alternativa CORRETA.**

Neoplasia de células epiteliais poliédricas reproduzindo arranjos em ninhos ou cordões, sustentadas por estroma fibroso. As células neoplásicas exibem citoplasma amplo e acidófilo, com pontes intercelulares. Há presença de material amorfo e acidófilo do tipo amiloide, calcificado concentricamente. Trata-se, provavelmente, de:

- a) tumor odontogênico adenomatoide.
- b) fibroma ameloblástico.
- c) tumor de Pindborg.
- d) cisto odontogênico calcificante.

**27. Marque a alternativa CORRETA.**

Neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares, ocorre usualmente entre a terceira e sexta décadas de vida, podendo ser encontrada em crianças:

- a) carcinoma em adenoma pleomórfico.
- b) carcinoma mucoepidermoide.
- c) carcinoma adenoide cístico.
- d) adenocarcinoma de células acinares.

**28. Marque a alternativa CORRETA.**

Doença relativamente rara, associa uveíte a úlceras recorrentes na boca e nos genitais. São ainda valorizados no diagnóstico os achados de lesões cutâneas semelhantes ao eritema nodoso e teste positivo de patergia. Trata-se de:

- a) doença de Behçet.
- b) eritema multiforme.
- c) penfigoide bolhoso.
- d) pênfigo familiar benigno.

**29. Marque a alternativa CORRETA.**

Dermatose de etiologia desconhecida, apresenta predisposição familiar, apresentando edema crônico e períodos de recorrência aguda nos lábios. Há associação com língua plicata e paralisia facial.

- a) granuloma de corpo estranho
- b) epidermólise bolhosa simples
- c) queilite granulomatosa
- d) doença de Bowen

**30. Marque a alternativa CORRETA.**

São aspectos gerais dos membros da subfamília *Bethaherpesvirinae*:

- a) acometem amplo espectro de hospedeiros, crescimento rápido em culturas de células e citopatia acentuada.
- b) associam-se a grande número de neoplasias linfoides, como o linfoma de Burkitt.
- c) causam primoinfecção aguda, latência nos gânglios sensoriais e episódios de recidiva.
- d) apresentam ciclos reprodutivos longos, afetam número restrito de hospedeiros e causam citomegalia.

**31. Marque a alternativa CORRETA.**

O sintoma mais comum na leishmaniose mucocutânea é:

- a) obstrução nasal.
- b) disfonia.
- c) disfagia.
- d) glossite moriforme.

**32. Marque a alternativa CORRETA.**

São usualmente observados na histopatologia das lesões cutâneas e mucosas da paracoccidioidomicose:

- a) atrofia epitelial, inflamação granulomatosa e hemorragias.
- b) hiperplasia pseudoepiteliomatosa com abscessos intraepiteliais e inflamação granulomatosa.
- c) acantose, hiperkeratose, papilomatose e infiltrado inflamatório granulomatoso.
- d) atrofia epitelial, parakeratose, hipergranulose e inflamação granulomatosa.

**33. Marque a alternativa CORRETA.**

Lesão óssea não neoplásica cuja histopatologia revela trabéculas descontínuas de osso imaturo de aspecto curvilíneo, sustentadas por estroma fibroso e com densidade celular variada de fibroblastos:

- a) querubismo.
- b) displasia cemento-óssea.
- c) doença de Paget.
- d) displasia fibrosa.

34. É **CORRETO** afirmar a respeito das sialadenites:

- a) A caxumba é a infecção virótica mais comum das glândulas salivares.
- b) As inflamações crônicas granulomatosas comprometem as glândulas acessórias.
- c) A sialometaplasia necrosante apresenta quadro granulomatoso substituindo ácinos e ductos.
- d) As sialadenites bacterianas são causadas pelo *Streptococcus pyogenes*.

35. Marque a alternativa **CORRETA**.

O carcinoma de células escamosas da mucosa bucal:

- a) tende a ser mais diferenciado quando localizado na língua.
- b) nas fases iniciais apresenta aspecto de eritroplasia ou de leucoeritroplasia.
- c) tem como principais variantes histológicas o basocelular e o fusocelular.
- d) tende a ser mais indiferenciado, quando localizado no lábio inferior.

36. Marque a alternativa **CORRETA**.

A flora bacteriana nas celulites maxilofaciais é:

- a) aeróbica.
- b) anaeróbica.
- c) mista.
- d) facultativa.

37. Marque a alternativa **CORRETA**.

A disseminação de infecção odontogênica para o seio cavernoso pode ocorrer através do(s) seguinte(s) vaso(s):

- a) veias emissárias do plexo pterigóideo.
- b) veia maxilar interna.
- c) veia jugular interna.
- d) veia oftálmica lateral.

38. Marque a alternativa **CORRETA**.

Os antibióticos de primeira escolha para tratar pacientes com actinomicose são:

- a) fluoroquinolonas.
- b) frademicinas.
- c) penicilinas.
- d) azitromicinas.

39. Marque a alternativa **CORRETA**.

O agregado de trióxido mineral tem sido amplamente utilizado em cirurgias parendodônticas. Dentre suas características, podemos afirmar que:

- a) leva menos de 20 minutos para atingir a presa final.
- b) é um material hidrófobo.
- c) pode ser colocado em um campo úmido de sangue.
- d) induz a formação de cimento.

40. Considerando os tipos de lesão dos nervos da região maxilofacial, assinale a alternativa **VERDADEIRA**.

- a) A axonotmese ocorre quando se perde a continuidade da bainha epineural.
- b) A axonotmese é a forma menos grave de lesão dos nervos periféricos.
- c) A neuropraxia é a forma mais grave de lesão dos nervos periféricos.
- d) A neurotmeese pode ser produzida por ruptura causada por projéteis de armas de fogo.

41. Nas exodontias dos caninos superiores, é **CORRETO** afirmar que:

- a) o movimento inicial é palatino.
- b) o dente é removido na direção vestibulo-incisal.
- c) não se aplica nenhuma força rotacional.
- d) o movimento apical deve ser evitado, a fim de prevenirmos o rompimento do assoalho nasal.

42. Marque a alternativa **CORRETA**.

Nas exodontias simples, pode-se afirmar que o dente que geralmente oferece maior dificuldade para o cirurgião é o:

- a) primeiro molar mandibular.
- b) primeiro molar maxilar.
- c) segundo molar maxilar.
- d) canino maxilar.

43. Marque a alternativa **CORRETA**.

Nas extrações múltiplas (sequenciais) envolvendo todo o quadrante superior esquerdo e o inferior ipsilateral, o último dente que devemos remover é o:

- a) canino inferior.
- b) primeiro molar inferior.
- c) segundo molar superior.
- d) canino superior.

44. Marque a alternativa **CORRETA**.

No tratamento farmacológico da xerostomia após radioterapia, geralmente utilizamos:

- a) dexametazona em doses moderadas.
- b) metil-prednisona em baixas doses.
- c) hidrocortisona de pilocapina.
- d) polifosfato de acetilcolina.

45. Marque a alternativa **CORRETA**.

Atualmente, encontra-se bem descrita a osteonecrose mandibular considerada efeito colateral do uso de quimioterapia à base de:

- a) cloro-etileno.
- b) aminas carboxiladas.
- c) tricloro-carboxilato.
- d) bifosfonatos.



46. Marque a alternativa **CORRETA**.

Pela ordem de incidência da sialolitíase, as glândulas mais afetadas são, em **ORDEM DECRESCENTE**:

- a) sublingual, submandibular e parótida.
- b) sublingual, parótida e submandibular.
- c) submandibular, parótida e sublingual.
- d) submandibular, sublingual e parótida.

47. Marque a alternativa **CORRETA**.

Nas avulsões dentárias completas, em caso de acidente, os meios mais apropriados para a armazenagem dos dentes são, **PELA ORDEM**:

- a) solução salina de Hanks ou saliva.
- b) leite ou saliva.
- c) saliva ou solução salina de Hanks.
- d) solução salina de Hanks ou leite.

48. Considerando a apneia obstrutiva do sono, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O problema primário é o colapso das vias aéreas durante o sono.
- b) O paciente apresenta interrupção do fluxo de ar por mais de 10 segundos.
- c) O portador dessa condição tem potencial para hipertensão renal.
- d) A cirurgia ortognática pode contribuir para a melhoria do quadro clínico.

49. A artrocentese está indicada em diferentes alterações da articulação têmporo-mandibular (ATM), **EXCETO**:

- a) pequenas aderências que limitam a mobilidade do disco articular.
- b) deslocamento anterior do disco articular, sem redução.
- c) travamento severo e persistente da ATM.
- d) anquilose da ATM.

50. Marque a alternativa **CORRETA**.

Nas sialadenites, a flora microbiana mais frequentemente associada é constituída por:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Streptococcus mutans*.
- c) *Difteroides fragili*.
- d) *Corynebacterium diphtheriae*.